

کاوش کیمیای کرمان

تولید کننده سموم دفع آفات نباتی





یکی از مهمترین دغدغه های کشاورزان، دفع آفات با ابزاری کارا، سالم و مقرون به صرفه می باشد. آفات نباتی را می توان به گروه های حشره ها، کنه ها، قارچ ها، نماتدها و علف های هرز تقسیم کرد. در حال حاضر مؤثرترین روش مبارزه با این آفات استفاده از سموم دفع آفات نباتی است که اگر بطور علمی و طبق موازین استاندارد استفاده شود، بیشترین تأثیر را در دفع آفات و کمترین اثر سوء را روی مصرف کنندگان و محیط زیست خواهد داشت.

شرکت کاوش کیمیای کرمان، در راستای خدمت به صنعت کشاورزی کشور و با هدف تولید سموم دفع آفات نباتی در فروردین ماه سال ۱۳۷۷ به شماره ۳۷۳۳ در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسید و پس از اخذ موافقت کلی سازمان حفظ نباتات و سایر مجوزهای لازم در بهمن ماه همان سال عملیات ساخت و ساز آن در شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان و طی قراردادی با شرکت AgrEvo آلمان که هم اکنون زیر مجموعه شرکت معظم بایر است، آغاز شد. پس از تکمیل ساختمانها و ماشین آلات طبق استانداردهای آگرو و انجام تولید آزمایشی تیودان در سال ۱۳۷۹ پروانه فرمولاسیون سموم دفع آفات نباتی را از سازمان حفظ نباتات دریافت نمود و در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ با دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن رسماً به بهره برداری رسید. طراحی کارخانه و تجهیزات موجود تماماً توسط متخصصان این شرکت در داخل کشور مطابق با استانداردهای آگرو انجام گرفته است و از پیشرفته ترین تجهیزات موجود در سطح جهانی بهره می برد. تلاش این شرکت از بدو تأسیس، تولید محصولات هر چه مرغوب تر و انجام خدمات بهتر و با کیفیت هرچه بیشتر و عرضه آنها به مشتریان عزیز با قیمت مناسب بوده است. هم اکنون کاوش مفتخر است که با سابقه دو دهه خدمت صادقانه و با ارائه محصولات ژنریک و نیز ثبت اختصای این شرکت از طریق شبکه توزیع وسیع و توانا در کنار کشاورزان به انجام وظیفه خود ادامه دهد.

حشـره کش ها

۴	آکتامیا
۵	اسپیروترامات
۶	بوپروفزین
۷	تیاترین
۸	تیاکلوپرید
۹	تیاکلوپرید + دلتامترین
۱۰	دiazیوش
۱۱	فوسکا
۱۲	فیپرونیل
۱۳	فیپرونیل گرانول
۱۴	کاروین
۱۵	کلرپیریفوس گرانول
۱۶	کیمیا دلتا
۱۷	لوفنورون
۱۸	کلرپیریفس اتیل + کلرپیریفوس متیل

پرمترین	۱۹
پروفنفسوس	۱۹
پیری پروکسی فن	۱۹
دلتامترین	۱۹
دیکلرووس	۲۰
دیمتوات	۲۰
فن پروپاترین	۲۰
فن والریت کاوش	۲۱
سایپرمترین	۲۱
سایپرمترین EC (حشره کش خانگی)	۲۱
سایپرمترین SC (حشره کش خانگی)	۲۲
فوزالون	۲۲
کلرپیریفوس	۲۲
مالاتیون	۲۳
هگزافلومورون	۲۳
اتیون	۲۳

۲۳	 استامی
۲۳	 ایمیداکلوپراید
۲۳	 ایندوکساکارب
ق ا ر چ ک ش ه	
۲۶	 آزوکسی استروبین + سایپرکونازول
۲۷	 بردو کیمیا
۲۸	 بوسکالید + کروزکسیم متیل
۲۹	 پروتیوکونازول + تبوکونازول
۳۰	 پروپاموکارب هیدروکلراید + فوزتیل آلومنیوم
۳۱	 تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول
۳۲	 دیفوروبین
۳۳	 دی متومورف + پیراکلواستروبین
۳۴	 سایپرکونازول
۳۵	 سایپروکونازول + کاربندازیم
۳۶	 سولفور

سیازوفامید	۳۷
سیموکسانیل+فاموکسادون	۳۸
فوزتیل آلومینیوم	۳۹
تبوکونازول + پروتیکونازول	۴۰
تیوفانات متیل	۴۱
تبوکونازول ۲۵%	۴۱
تبوکونازول ۶%	۴۱
تری سیکلازول	۴۱
تری دمورف	۴۲
دیفنوكونازول	۴۲
فلوتریافول	۴۲
کاربندازیم	۴۲
کاربوکسین تیرام	۴۳
کروزاکسیم متیل	۴۳
کلرتالونیل ۷۲%	۴۳
کلرتالونیل ۷۵%	۴۳

۴۴	پوکسی کونازول
۴۴	ایپرودیون + کاربندازیم
۴۴	پنکونازول
۴۴	پروپیکونازول
۴۵	کوپراکسی کلراید
۴۵	مانکوزب
۴۵	هگزا کونازول
	کنه کش
۴۸	اسپیرو دیکلوفن
۴۹	اتوکسازول
۵۰	بی فنازیت
۵۱	کاوامکتین
۵۲	آبامکتین
۵۲	بروموپروپیلات
۵۲	پروپارژیت
۵۲	فنازا کوئین

فن پیروکسیمیت	۵۳
کلوفنتزین	۵۳
هگزی تیاژوکسی	۵۳

ع ا ف ک ش ه ا

بیس پیریپاک سدیم	۵۶
سنکو کیمیا	۵۷
کلتودیم	۵۸
گلایفوس	۵۹
وجین	۶۰
آتلانتیکا	۶۱
نووللو	۶۲
گلایار	۶۳
بنتازون	۶۴
پاراکوات	۶۴
تری بنورون	۶۴

۶۴	تری فلورالین
۶۵	تو فور دی
۶۵	تو فور دی + ام سی پی آ
۶۵	تیوبنکارب
۶۵	دیکلوفوپ متیل
۶۶	ستوکسیدیم
۶۶	فن مدیفام+دس مدیفام+توفومازیت
۶۶	فنوکسaproپ پی اتیل
۶۶	کلودینافوپ پروپارژیل
۶۷	گلیفوزیت
۶۷	لینورون
۶۷	مولینت
۶۷	نیکوسولفورون
۶۸	ای پی تی سی
۶۸	اکسی فلورفن
۶۸	اگزادiazون

ایوکسینیل	۶۸
هالوکسی فوپ آرمیتیل	۶۹
سایر محصولات	
صابون محلول پاشی حاوی گوگرد	۷۲
سولفوکیم	۷۳
روغن امولسیون شونده (ولک)	۷۴
متمام سدیم	۷۴
روغن ولک	۷۴
بهساز	۷۴
موارد ثبت سموم	
راهنمای موارد ثبت سموم	۷۵



حشره کش ها



حشره کش

آکتامیا ۲۴% سوپانسیون

(Thiamethoxam 24% SC)

(تیامتوکسام ۲۴% سوپانسیون)



• نحوه اثر:

حشره کش سیستمیک، با عملکرد تماسی و گوارشی سریع می باشد.

• موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	پسیل پسته	۴۰۰ الی ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۶۰ روز

حشره کش

اسپیروتترامات کاوش ۱۰٪ سوسپانسیون Spirotetramat 10% SC



● نحوه اثر:

حشره کش سیستمیک که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری به عمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوند چوب و آبکش بطرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	پسیل پسته	۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۷ روز
باغات سیب	سپردار واوی	۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۷ روز
گوجه فرنگی	سفید بالک	۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۳ روز
پیاز	تریپس	۶۰۰ سی سی در هکتار	۷ روز
مرکبات	سپردار قهوه ای مرکبات	۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز

حشره کش

بوپروفیزین کاوش ۴۰% سوپانسیون SC Buprofezin 40% SC



• نحوه اثر:

حشره کش انتخابی با خواص تماسی، تدخینی با پایداری زیاد
از گروه تیادیازین IGR (جلوگیری کننده پوست اندازی آفات).

• موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پنبه	سفید بالک پنبه	۱۲۵۰ سی سی در هکتار	۱۴ روز
مرکبات	بالشتک مرکبات	۵۰۰ تا ۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۷ روز

تیاترین ۲۵٪ سوسپانسیون

(Thiamethoxam + Lambda - cyhalothrin)



• نحوه اثر:

حشره کش ترکیبی با خواص تماسی، گوارشی و سیستمیک قوی. تیماتوکسام: حشره کش سیستمیک، با اثر تماسی و گوارشی سریع. لامبدا سای هالوترین: حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی، با خاصیت دورکنندگی و ابقائی.

• موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	سن های زیان آور	۴۰۰ الی ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۵۰ روز
خیار	حشره بالغ سفید بالک خیار	۳۰۰ سی سی در هکتار	۳ روز

حشره کش تیاکلورید کاوش ۲۴٪ روغن قابل پخش در آب Thiacloprid 24% OD

1 Lit



● نحوه اثر:

حشره کش تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک که بر روی سیستم اعصاب مرکزی اثر می گذارد .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	پسیل پسته	۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۲۱ روز
پسته	سوسک سرشاخه خوار	۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش به همراه ۲ در هزار روغن وُلک	۲۱ روز
پسته	سن پسته	۴۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۲۱ روز
باغات سیب	کرم سیب	۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
کلزا	سوسک گرده خوار کلزا	۳۰۰ سی سی در هکتار	۲۸ روز

حشره کش تیاکلوپرید+دلتامترین کاوش ۱۱% روغن قابل پخش در آب Thiacloprid+Deltamethrin 11% OD

(حاوی ۱۰% تیاکلوپرید و ۱% دلتامترین)



● نحوه اثر:

حشره کش ترکیبی وسیع الطیف با خاصیت تماسی و گوارشی قوی
(نیمه سیستمیک) •

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
محصولات جالیزی	حشره بالغ سفید بالک	یک لیتر در هکتار	۳ روز
پنبه	کرم غوزه پنبه	یک لیتر در هکتار	۱۴ روز
پیاز	تریپس پیاز	۷۰۰ سی سی در هکتار	۳ روز

حشره کش

دiazivosh 60% EW پود قابل تعلیق در آب
(Diazinon 60% EW)
(دiazinon ۶۰٪ ای - دیبو)



● نحوه اثر:

فرمولاسیون نسل جدید و ویژه EW شرکت کاوش کیمیای کرمان خواص این حشره کش را بهبود می بخشد .
فرمولاسیون دیازپوش بر خلاف فرمولاسیون های EC در بازار عاری از حلال های مضر برای محیط زیست و سایر موجودات است .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
سیب	کرم سیب	۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	-
گلابی	پسیل گلابی	۱ لیتر در هزار لیتر آب	-
نخل	شپشک نخيلات	۱/۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب	-
پسته	شپشک پسته	۱ لیتر در هزار لیتر آب	-
مرکبات	شپشک مرکبات	۱ لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	-
برنج	کرم ساقه خوار برنج	۲ لیتر در هکتار	-
درختان میوه و درختان جنگلی	کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی	۳ تا ۳/۵ لیتر در هزار لیتر آب (محل ریزی در اطراف سایه انداز)	-
کاج	جوانه خوار کاج	۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	-
درختان میوه	شته و لیسه درختان میوه	۱ لیتر در هزار لیتر آب	-
انگور	تریپس، کرم خوشه خوار انگور	۱ لیتر در هزار لیتر آب	-

فوسکا ۴۰/۸ % پود قابل تعلیق در آب

(Chlorpyrifos 40.8% EW

(کلرپیریفوس ۴۰/۸ % ای - دیلیو)



● نحوه اثر:

حشره کشی با خاصیت تماسی، گوارشی و تنفسی و غیرسیستمیک با اثر ابقایی بسیار زیاد برای کنترل طیف وسیعی از آفات مهم محصولات کشاورزی .
فرمولاسیون فوسکا بر خلاف فرمولاسیون های رایج این حشره کش در بازار عاری از حلال های مضر برای محیط زیست و سایر موجودات است.

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
مرکبات	سپردار زرد شرقی	۷۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۴۰ روز

حشره کش

Fipronil 5% SC

فیپرونیل کاوش ۵% سوپانسیون



● نحوه اثر:

حشره کش تماسی گوارشی با طیف وسیع و با خاصیت ضربه ای از نسل جدید حشره کش ها .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
انگور	زنجره مو	۲۰ سی سی به ازای هر درخت (به صورت خاک مصرف)	۱۴ روز
برنج	کرم ساقه خوار برنج	۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سی سی در هکتار جهت کنترل نسل دوم	۱۴ روز

فایپرونیل ۰.۲٪ گرانول Fipronil 0.2% G



● نحوه اثر:

حشره کش تماسی با طیف وسیع و نسبتاً سیستمیک .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
برنج	کرم ساقه خوار برنج	۲۰ کیلو در هکتار	۱۲ روز

حشره کش

کاروین ۵۳% سوپانسیون

(Thiodcarb 53% SC)

(تیودیکارب ۵۳% سوپانسیون)



● نحوه اثر:

حشره کش با اثر گوارشی و تماسی محدود می باشد
کاروین با ماده موثره تیودیکارب حشره کشی قوی از گروه
کاربامات ها با اثر گوارشی و تماسی محدود و خاصیت تخم کشی،
گزینه بسیار مناسب در مدیریت تلفیقی آفات .
کاروین از مزایای ماندانبار داری راحت و ایمن و نبود خطراتی
مانند انفجار و خود احتراقی و نداشتن گرد و غبار در زمان مصرف
در مقایسه با تیودیکارب با فرمولاسیون DF رایج بازار برخوردار
است .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پنبه	کرم غوزه پنبه	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز

کلرپیرفوس ۵٪ گرانول Chlorpyrifos 5% G



• نحوه اثر:

حشره کش تماسی و گوارشی غیر سیستمیک با مقداری خاصیت تدخینی و دوام طولانی .

• موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
چغندر قند	کرم های طوقه بر (اگروتیس)	۲۰ تا ۲۵ کیلو در هکتار	ذکر نشده است

حشره کش

کیمیا دلتا ۲/۵% سوپانسیون SC

(Deltamethrin 2.5% SC)

(دلتامترین ۲/۵% اس - سی)



● نحوه اثر:

با ماده موثره دلتامترین حشره کش تماسی و گوارشی بسیار سریع
الایر با پایداری زیاد.
فرمولاسیون کیمیا دلتا بر خلاف فرمولاسیون های رایج این حشره
کش در بازار، عاری از حلال های مضر برای محیط زیست و سایر
موجودات است.

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
گندم	پوره سن و سن گندم	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز



● نحوه اثر:

حشره کش غیر سیستمیک که عمدتاً از طریق گوارشی و کمی تماسی تأثیر می گذارد. تنظیم کننده رشد حشرات است و از سنتز کتین ممانعت کرده و باعث اختلال در پوست اندازی لاروها می شود

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	پروانه چوبخوار	یک و نیم لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۶۰ روز
باغات سیب	کرم سیب	یک لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۲۸ روز
گلابی	پسیل گلابی	یک و نیم لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۲۸ روز

حشره کش کلرپیرفوس اتیل + کلرپیرفوس متیل ۴۰٪ امولسیون Chlorpyrifos-methyl + Chlorpyrifos ethyl 40% EC



● نحوه اثر:

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی و کمی تدخینی حشره کش ترکیبی بسیار با دوام که شامل ۴۸۰ گرم کلرپیرفوس اتیل و ۲۰ گرم کلرپیرفوس متیل در لیتر می باشد. این حشره کش از گروه فسفره آلی غیر سیستمیک و زیرگروه اسید فسفروتیوپیک با خاصیت تماسی، گوارشی و تدخینی است به همین دلیل جهت مبارزه با آفات بهداشتی در دنیا کاربرد فراوانی دارد.

● موارد مصرف:

آفت	میزان مصرف
موریانه	۱۰ لیتر در هزار لیتر آب



پروفنفوس کاوش
۵۰% امولسیون



دلتامترین کاوش
۲/۵% امولسیون



پرمترین کاوش
۲۰% امولسیون



پیری پروکسی فن کاوش
۱۰% امولسیون



دیمتوات کاوش
۴۰% امولسیون



دیکلروس کاوش
۵۰% امولسیون



فن والریٹ کاوش
۲۰% امولسیون



فن پروپاترین کاوش
۱۰% امولسیون



سایپرمترین (حشره کش خانگی)
۱۰% امولسیون



سایپرمترین کاوش
۴۰% امولسیون



فنیتروتیون کاوش
۵۰% امولسیون



سایپرمترین (حشره کش خانگی)
۱۰% سوسپانسیون



کلرپیریفوس کاوش
۴۰/۸ % امولسیون



فوزالون کاوش
۳۵ % امولسیون



هگزافلومورون کاوش
۱۰ % امولسیون



مالاتیون کاوش
۵۷ % امولسیون

0.25Kg.....



استامی پراید
۲۰٪ پودر حل شونده در آب

1 Lit.....



اتیون کاوش
۴۷٪ امولسیون

.....0.25Lit



ایندوکساکارب کاوش
۱۵٪ سوسپانسیون

0.8Lit.....

.....1 Lit

.....0.5Lit

0.25Lit.....

0.1Lit.....



ایمیداکلوپراید کاوش
۳۵٪ سوسپانسیون



قارچ کش ها



قارچ کش

آزوکسی استروبین+سایپروکونازول کاوش ۲۸% سوپانسیون
Azoxyystrobin+ciproconazole 28% SC
(حاوی ۲۰% آزوکسی استروبین و ۸% سایپروکونازول)



• نحوه اثر:

قارچکش سیستمیک است که طیف وسیعی از بیماریهای قارچی را بخوبی مهار می کند. این قارچکش مخلوطی از ۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین از گروه استروبیلورین ها و ۸۰ گرم سایپروکونازول از گروه تریازول ها می باشد. که با دارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت، با خاصیت پیشگیری و درمان بیماری های گندم را بخوبی کنترل می کند .

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گندم	زنگ گندم	۷۵۰ سی سی در هکتار	۲۸ روز

(سولفات مس خنثی شده)



● نحوه اثر:

بردو کیمیا با کتری کش و قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی می باشد که جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می شود.

● موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
سیب	شانکرسیتوسپرای	۲۰ لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش در زمان متورم شدن جوانه های درخت و تکرار در پاییز پس از ریزش کامل برگ ها	-

قارچ کش

بوسکالید+کروزکسیم متیل کاوش ۳۰% سوسپانسیون
Boscalid+Kresoxim Methyl 30% SC

(حاوی ۲۰% بوسکالید و ۱۰% کروزکسیم متیل)



• نحوه اثر:

قارچ کش ترکیبی با اثر حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده پاتوژن های گیاهی که با اثر ابقایی بلند مدت و جلوگیری از جوانه زنی و نفوذ اسپور، رشد و توسعه میسلیم قارچ، تکثیر و تولید مثل آن ها کنترل بسیار موثری ایجاد می کند.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
خیار	سفیدک پودری	۴۰۰ سی سی در هکتار	۳ روز
هلو و شلیل	سفیدک پودری	۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۷ روز
گوچه فرنگی	سفیدک سطحی (پودری)	۵۰۰ سی سی در هکتار	- روز

قارچ کش

پروتیوکونازول + تبوکونازول کاوش ۴۰% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر

Prothioconazole+Tebuconazole 40% FS

(حاوی ۲۵% پروتیوکونازول و ۱۵% تبوکونازول)



• نحوه اثر:

قارچ کش ترکیبی سیستمیک با خاصیت درمانی حاوی ۱۵۰ گرم تبوکونازول و ۲۵۰ گرم پروتیوکونازول جهت کنترل طیف وسیعی از بیماری های بذر زاد و خاکری.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گندم	سیاهک آشکار	۲۰۰ سی سی برای یک تن بذر	-
گندم	سیاهک پنهان	۱۵۰ سی سی برای یک تن بذر	-
جو	سیاهک آشکار	۱۵۰ سی سی برای یک تن بذر	-

قارچ کش

پروپاموکارب هیدروکلراید + فوزتیل آلومینیوم کاوش ۸۴٪ ایج قابل حل در آب
Propamocarb Hydrochloride + Fosetyl - Aluminum 84% SL
 (۳۱٪ فوزتیل و ۵۳٪ پروپاموکارب)



• نحوه اثر:

قارچ کشی با خاصیت سیستمیک دو طرفه حاوی دو ماده موثره: ۳۱٪ گرم پروپاموکارب و ۵۳٪ گرم فوزتیل آلومینیوم که دارای خاصیت پیشگیری و درمان می باشد.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
خیار	بوته میری (ناشی از قارچ پیتوم و فیتوفترا)	۳ لیتر در هکتار به همراه آبیاری	۳ روز

قارچ کش

تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول ۷۵% گرانول پخش شونده در آب

Tebuconazole+ Trifloxystrobin 75% WG

(حاوی ۵۰% تبوکونازول و ۲۵% تری فلوکسی استروبین)



● نحوه اثر:

قارچ کش ترکیبی با عملکرد جذبی و سیستمیک که حاوی ۲۵۰ گرم تری فلوکسی استروبین و ۵۰۰ گرم تبوکونازول در لیتر است. که با سه عملکرد (درمان، ریشه کنی و محافظت) گیاهان را در مقابل طیف وسیعی از بیماریهای قارچی محافظت می کند.

● موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
سیب	سفیدک پودری	۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
سیب	لکه سیاه	۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
چغندر	سفیدک سطحی (پودری)	۲۰۰ گرم در هکتار	- روز
برنج	بلاست	۴۰ گرم در هکتار	۲۱ روز
برنج	شیت بلایت	۴۰ گرم در هکتار	۲۱ روز

قارچ کش

دیفوروبین ۳۲/۵% سوپانسیون SC

(۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین و ۱۲۵ گرم دیفنوکونازول)



• نحوه اثر:

قارچ کش سیستمیک و تماسی با اثر حفاظتی، معالجه و ریشه کن کننده جهت کنترل سفیدک سطحی (پودری) جالیز دیفوروبین قارچ کشی با عملکرد جذبی و سیستمیک که حاوی ۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین و ۱۲۵ گرم دیفنوکونازول در لیتر است. و بلافاصله پس از مصرف، جذب و به سرعت وارد شیره گیاهی شده و در سرتا سر برگ و سایر اندام های هوایی منتشر شده و به خوبی سه عملکرد (درمان، ریشه کنی و محافظت) را در مقابل طیف وسیعی از قارچ های مخرب ایجاد می کند.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
خیار	سفیدک پودری خیار گلخانه ای	۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب سمپاش	۳ روز

قارچ کش

دی متهومورف+پیراکلوستروبین کاوش ۱۱/۲% امولسیون

Dimetomorph+Pyraclostrobin 11.2% EC

(حاوی ۷/۲% دی متهومورف و ۴% پیراکلوستروبین)



● نحوه اثر:

قارچ کشی ترکیبی با خاصیت حفاظتی و درمانی که دارای نحوه عملکرد دوگانه می باشد که با رفتار سیستمیک موضعی که توانایی ذخیره در بافت و نسوج گیاه را داشته که سبب محافظت طولانی مدت می گردد.

● موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گوچه فرنگی	آلترناریا	دو لیتر در هکتار	۳ روز

قارچ کش

سایپروکونازول کاوش ۱۰٪ ا.ع قبل حل در آب Cyproconazole 10% SL



● نحوه اثر:

قارچ کش سیستمیک جهت پیشگیری، درمان و ریشه کنی با ممانعت از سنتز ارگسترول بیماری زنگ را کنترل می کند

که حاوی ۱۰۰ گرم سایپروکونازول در لیتر است.

قدرت قارچ کشی بسیار بالا با مقدار کم ماده موثره (پنجاه گرم ماده موثره در هکتار) که نتیجه آلودگی کمتر محیط زیست می باشد. براساس شواهد علمی و ارزیابی هایی که در دنیا صورت گرفته یک بار مصرف این قارچ کش به مدت ۴۲ روز غلات را در مقابل زنگ ها و سفیدک ها واکسینه کرده است. منجر به کاهش دفعات سمپاشی می گردد.

● موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گندم	زنگ گندم	نیم لیتر در هکتار	۴۲ روز

قارچ کش سایپروکونازول+کاربندازیم ۴۲% سوسپانسیون Cyproconazole+Carbendazim 42% SC

(حاوی ۳% کاربندازیم و ۱۲% سایپروکونازول)



• نحوه اثر:

قارچ کش ترکیبی سیستمیک با اثر حفاظتی، معالجه و ریشه کن کننده پاتوژن های گیاهی که حاوی ۳۰۰ گرم کاربندازیم و ۱۲۰ گرم سایپروکونازول در لیتر است که گیاهان را در مقابل طیف وسیعی از بیماریهای قارچی محافظت می کند.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گندم	فوزاریوم منبله	۵۰۰ سی سی در هکتار	۴۲ روز
کلم	پوسیدگی ساقه در اثر قارچ اسکروتینایی	یک لیتر در هکتار	۴۲ روز

قارچ کش

Sulfur 80% SC

سولفور کاوش ۸۰% سوسپانسیون



• نحوه اثر:

قارچ کش غیرسیستمیک محافظ با اثر تماسی و تدخینی سولفور، قارچ کش و کنه کش تماسی و حفاظتی که حاوی ۸۰ درصد گوگرد است. از گروه مواد معدنی با تکنولوژی سوسپانسیون کاوش کیمیا کرمان تهیه شده است.

از جمله مزایای فرمولاسیون سولفور سوسپانسیون:

عدم ایجاد گرد و غبار در زمان استفاده

حمل آسان تر

انبار داری راحت و ایمن

قابلیت پخش شوندگی و چسبندگی بیشتر و بهتر و کاهش خطر گیاه

سوزی و باران تابی

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
انگور	سفیدک سطحی	۲,۵ لیتر در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۲۰ روز



• نحوه اثر:

این قارچ کش از گروه سیانوایمیدازول است و نقش حفاظتی دارد که با خاصیت تماسی و نفوذی که از طریق اختلال در زنجیره تنفسی میتوکندری سیب جلوگیری از چرخه تکاملی قارچ ها می گردد. (جلوگیری از جوانه زنی و تشکیل زئوسپور روی برگها)

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
خیار گلخانه ای	سفیدک داخلی	۴۰۰ الی ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۳ روز
سیب زمینی	سفیدک داخلی	۱۵۰ سی سی در هکتار	۳ روز

قارچ کش سیموکسانیل + فاموکسادون 52.5% WG Cymoxanil + Famoxadone 52.5% WG (حاوی ۳۰% سیموکسانیل + ۲۲/۵% فاموکسادون)



• نحوه اثر:

قارچ کش با طیف وسیع جهت پیشگیری، درمان و حفاظت با تأثیر ابقائی
قارچ کش ترکیبی است که با توجه به مواد مؤثر متشکله آن دارای خواص پیشگیری کننده، درمان و تأثیر ابقایی می باشد. که حاوی ۲۲/۵ درصد فاموکسادون و ۳۰ درصد سیموکسانیل بر کیلوگرم می باشد.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
کدوئیان	سفیدک داخلی	۲۰۰ گرم در هکتار	۳ روز
پیاز	سفیدک داخلی	۴۰۰ گرم در هکتار	۳ روز
سیب زمینی	سفیدک داخلی	۴۰۰ گرم در هکتار	۳ روز

قارچ کش فوزتیل آلومینیوم ۸۰٪ گرانول پخش شونده در آب Fosetyl-Aluminium 80% WG



• نحوه اثر:

قارچ کش سیستمیک با عملکرد درمان کننده که
بسرعت توسط برگ ها و ریشه جذب می گردد. با
قابلیت انتقالی از بالا به پایین و بالعکس

• موارد مصرف:

مخصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
پسته	بیماری گموز	۲/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۴۲ روز

قارچ کش

تبوکونازول + پروتیكونازول FS%۴۰ مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر
Prothioconazole+Tebuconazole 40% FS



• نحوه اثر:

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه
کشی
حاوی ۱۵۰ گرم تبوکونازول و ۲۵۰ گرم پروتیكونازول جهت کنترل
طیف وسیعی از بیماری های بذر زاد و خاکزی.

• موارد مصرف:

محصول	بیماری	میزان مصرف	کارنس
گندم	سیاهک آشکار	۲۰۰ سی سی برای یک تن بذر	-
گندم	سیاهک پنهان	۱۵۰ سی سی برای یک تن بذر	-
سیب زمینی	سیاهک آشکار	۱۵۰ سی سی برای یک تن بذر	-



تبوکونازول کاوش
۲۵٪ روغن در آب



تیوفانات متیل
۷۰٪ پود قابل تعلیق در آب



تری سیکلازول
۷۵٪ پود قابل تعلیق در آب



تبوکونازول کاوش
۶٪ مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر



دیفنوکونازول کاوش

۳% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر



تری دمورف کاوش

۷۵% امولسیون



کاربندازیم

۵۰% پود قابل تعلیق در آب



فلوتریافول کاوش

۱۲/۵% سوسپانسیون



کروزاکسیم متیل

۵۰٪ گرانول پخش شونده در آب



کاربوکسین تیرام کاوش

۴۰٪ مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر



کلرتالونیل کاوش

۷۲٪ سوسپانسیون



کلرتالونیل

۷۵٪ پود قابل تعلیق در آب



ایپرودیون + کاربندازیم کاوش
۵۲/۵٪ پود قابل تعلیق در آب



اپوکسی کونازول کاوش
۱۲/۵٪ سوپانسیون



پروپیکونازول کاوش
۲۵٪ امولسیون



پنکونازول کاوش
۲۰٪ روغن در آب



مانکوزب

۸۰% پود قابل تعلیق در آب



کوپراکسی کلراید

۳۵% پود قابل تعلیق در آب



هگزاکونازول کاوش

۵% سوسپانسیون



کنه کش ها



کنه کش و حشره کش

اسپروکلوفن کاوش ۲۴% سوسپانسیون SC Spiroclorfen P 24% SC



● نحوه اثر:

حشره کش و کنه کش انتخابی غیرسیستمیک و تماسی از خانواده تترونیک اسید جهت کنترل طیف وسیعی از کنه ها و پسیل ها در محصولات کشاورزی .

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
پسته	پسیل پسته	۳۰۰ تا ۴۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۷ روز
سیب	کنه قرمز اروپایی	۵۰۰ تا ۶۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
سیب	کنه تارتین دو نقطه ای	۵۰۰ تا ۶۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
مرکبات	کنه قرمز	۲۰۰ الی ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز
مرکبات	کنه زنگار	۱۸۰ تا ۲۷۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱۴ روز



● نحوه اثر:

کنه کش تماسی غیر سیستمیک که متعلق به گروه دیفنیلوکسازولین که یک تنظیم کننده رشد کنه است که به صورت تماسی عمل کرده و با مختل کردن (MGR) ساخت کیتین و پوست اندازی رشد تخم، لارو و پوره ها را متوقف می کند.

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
سیب	مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی	۲۵۰ تا ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش بلافاصله پس از تفریخ تخم ها	۲۱ روز

کنه کش

بی فنازیت کاوش ۲۴% سوپانسیون Bifenazate 24% SC



• نحوه اثر:

بی فنازیت کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و اثر ضربه ای شدید و موثر روی تخم های تابستانه با دز پایین مصرفی و دوره کارنس کوتاه جهت تولید محصول سالم در محصولات جالیزی و سبزی و صیفی .

• موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
توت فرنگی	کنه تارتن دو نقطه ای	۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۳ روز
خیار	کنه تارتن دو نقطه ای	در گلخانه ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۱ روز
رژ	کنه تارتن دو نقطه ای	در گلخانه ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	-
سیب	کنه تارتن دو نقطه ای	۷۰۰ سی سی در هزار لیتر آب مخزن سمپاش	۳ روز

کنه کش و حشره کش

کاوامکتین ۱/۸ % سوسپانسیون Kavamectin 1.8% SC

(آبامکتین ۱/۸ % سوسپانسیون)

(Abamectin 1.8% SC)



● نحوه اثر:

کاوامکتین با ماده موثره آبامکتین با خاصیت تماسی، گوارشی و نفوذی جهت کنترل مراحل متحرک کنه‌ها و مگس‌های مینوز. فرمولاسیون کاوامکتین به صورت سوسپانسیون بوده و علاوه بر تاثیر گذاری بسیار مطلوب بر روی آفات هدف عاری از حلال‌های شیمیایی خطرناک مانند زایلن می‌باشد. کاوامکتین برخلاف آبامکتین با فرمولاسیون امولسیون EC باعث به هم خوردن تعادل هورمونی در گیاه نشده در نتیجه منجر به تولید گل‌نر در برخی محصولات زراعی مانند خیار نمی‌گردد.

● موارد مصرف:

محصول	آفت	میزان مصرف	کارنس
سبزی و صیفی	مگس مینوز سبزی و صیفی	۶۰۰ سی سی در هکتار	۳ روز
مرکبات	کنه زنگ مرکبات	۲۰ میلی لیتر + ۲۵۰ میلی لیتر روغن و لک در ۱۰۰ لیتر آب	۷ روز



بروموپروپیلات کاوش
۲۵% امولسیون



آبامکتین کاوش
۱/۸% امولسیون



فنازاکوئین کاوش
۲۰% سوسپانسیون



پروپارژیت کاوش
۵۷% امولسیون



.....•0.25Lit

کلوفنتزین کاوش
۵۰% سوسپانسیون

0.5Lit.....



فن پیروکسیمیت کاوش
۵۰% سوسپانسیون

.....•0.5Lit



0.1Lit.....



هگزئی تیاوکس کاوش
۱۰% امولسیون



علف کَش ها



علف کش

بیس پیریاک سدیم کاوش ۴۰% سوسپانسیون
Bispyribac-Sodium 40% SC

0.1 Lit



● نحوه اثر:

علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع برنج است برای کنترل علف های هرز نازک برگ، پهن برگ و جگن ها در در خزانه، کشت مستقیم و نشاء کاری برنج قابل مصرف می باشد.

● موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
برنج	علف های هرز پهن برگ و جگن ها	۶۵ سی سی در هکتار از دو تا چهار برگی شدن برنج

سنکو کیمیا ۴۸٪ سوسپانسیون SC Senko Kimia 48% SC

(متری بوزین ۴۸٪ سوسپانسیون)

(Metribuzin 48% SC)



● نحوه اثر:

سنکو کیمیا علفکش سیستمیک و انتخابی است، بر اساس ماده موثره متریبوزین که از طریق ریشه ها، برگ و ساقه علف های هرز جذب می شود.

فرمولاسیون ایمن این محصول از در زمان استفاده فاقد هر گونه گرد و غبار بوده و منجر به بادبردگی و یا استنشاق توسط کاربران نمی شود. همچنین سنکو کیمیا شرکت کاوش با فرمولاسیون SC ۴۸٪ بسته به شرایط ۷۵۰ سی سی تا یک لیتر در هکتار مصرف می گردد که برآیند استفاده از سنکو کیمیا به معنی کاهش ۳۰ درصد ماده موثره در هکتار و آلودگی کمتر محیط زیست و کاهش معنا دار باقیمانده علفکش برای کشت بعدی می باشد (مدیریت و کاهش محدودیت تناوب کشت)

● موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
سیب زمینی	علف های هرز پهن برگ و نازک برگ	۱ لیتر در هکتار

علف کش

Clethodim 12% EC
کلتودیم ۱۲% امولسیون



● نحوه اثر:

علف کش سیستمیک و انتخابی که به سرعت از طریق برگها جذب شده و به ریزوم ها یا ریشه های علف های هرز منتقل می گردد.

● موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
چغندر	علف های هرز باریک برگ	۱۰-۸ لیتر در هکتار
سویا	علف های هرز باریک برگ	۷۲-۱ لیتر در هکتار
پياز	علف های هرز باریک برگ	۷۲ لیتر در هکتار

گلایفوس 41% مایع قابل حل در آب

Glyphosate 41% SL

(گلیفوزیت 41% اس - ال)

(Glyphosate 418% SL)



• نحوه اثر:

گلایفوس علف کشی از گروه اسیدفسفونیک می باشد که به جای نمک ایزوپروپیل آمین) از ملح پتاسیم استفاده شده است که برای کنترل کلیه علفهای هرز ناز برگ و پهن برگ چندساله در باغات و زمین های غیرزراعی به صورت محلول پاشی استفاده می شود این فرمولاسیون اختصاصی شرکت کاوش از سرعت جذب و تاثیر بیشتری در مقایسه با فرمولاسیون های رایج برخوردار است

• موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
باغات	علف های هرز یکساله	میزان مصرف ۸ لیتر در هکتار

علف کش

وجین ۱۲/۵ سوپانسیون

(Bispyribac-sodium 12.5% SC) (بیسپیریباک سدیم ۱۲/۵ سوپانسیون)



● نحوه اثر:

علفکش انتخابی و سیستمیک مزارع برنج است حاوی ماده موثره بیس پیریباک سدیم که برای کنترل علف های هرز نازک برگ، پهن برگ و جگن ها در در خزانه، کشت مستقیم و نشاء کاری برنج قابل مصرف می باشد.
دز مصرف بیس پیریباک سدیم در مقایسه با سموم رایج قدیمی بسیار کمتر است .

● موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
برنج	علف های هرز پهن برگ و جگن ها	۲۸۰ تا ۳۲۰ سی سی در هکتار از دو تا چهار برگی شدن برنج



● نحوه اثر:

علفکش دو منظوره مزارع گندم حاوی یدوسولفورون متیل سدیم+ مزوسولفورون متیل به همراه ایمن کننده مفن پایردی اتیل به منظور کنترل طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و نازک برگ گندم .

● موارد مصرف:

میزان مصرف	علف هرز	محصول
۱/۵ لیتر در هکتار	علف های هرز پهن برگ و نازک برگ	گندم

Novello 8/25% OD

علف کش
نووالو ۸۲۵٪ روغن پخش شونده در آب



● نحوه اثر:

علفکش دو منظوره جهت کنترل طیف وسیع علف های هرز پهن برگ و نازک برگ سمج که حاوی یدوسولفورون متیل سدیم+ مزوسولفورون متیل +دیفلوفنیکان به همراه ایمن کننده مفن پایردی اتیل می باشد.

● موارد مصرف:

محصول	علف هرز	میزان مصرف
گندم	علف های هرز پهن برگ و نازک برگ	۱۶ لیتر در هکتار

گلیار کاوش علف کش Glyar



• نحوه اثر:

گلیار ارجوونت (ماده کمک کننده) اختصاصی جهت استفاده همراه با علفکش گلیافوزیت و گلیافوس کاوش کیمیای کرمان است. این محصول جدید از طریق اصلاح pH، کنترل سختی آبهای سمپاشی و افزایش نفوذ پذیری گلیافوزیت به گیاه باعث ارتقا خواص سیستمیک گلیافوزیت و گلیافوس می شود. نتیجه حاصل، کنترل بهتر علفهای سمج و کاهش چشمگیر دز مورد نیاز است.

• موارد مصرف:

میزان مصرف

یک لیتر گلیار به ازای هر لیتر علفکش گلیافوزیت یا گلیافوس



پاراکوات کاوش
۲۰٪ مایع قابل حل در آب



بنتازون کاوش
۴۸٪ مایع قابل حل در آب



تری فلورالین کاوش
۴۸٪ امولسیون



تری بنورون متیل
۷۵٪ پودر قابل انتشار در آب



تو فور دی + ام سی پی آ کاوش
۶۷/۵٪ مایع قابل حل در آب



تو فور دی کاوش
۷۲٪ مایع قابل حل در آب



دیکلوفوپ متیل کاوش
۳۶٪ امولسیون



تیو بن کارب کاوش
۵۰٪ امولسیون



فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت
۲۷/۴٪ امولسیون



ستوکسیدیم کاوش
۱۲/۵٪ امولسیون روغنی



کلودینافوپ پروپارژیل کاوش
۸٪ امولسیون



فنوکسaprof پی اتیل کاوش
۷/۵٪ روغن در آب



لینورون کاوش
۴۵% سوسپانسیون



گلیفوزیت کاوش
۴۱% مایع قابل حل در آب



نیکوسولفورون
۴% امولسیون



مولینت کاوش
۷۱% امولسیون



اکسی فلورفن کاوش
۲۴% امولسیون



ای پی تی سی کاوش
۸۲% امولسیون



ایوکسینیل کاوش
۲۲/۵% امولسیون



اگزادپازون کاوش
۱۲% امولسیون



هالوکسی فوپ آرمیتیل کاوش
۸/۱۰٪ امولسیون







● میزان مصرف:

۳ لیتر در هزار.

● فواید و موارد مصرف:

۱. شستشوی برگ درختان
۲. کنترل PH و سختی آب های قلیایی
۳. افزایش سوخت و ساز گیاه از طریق افزایش فتوسنتز
۴. دور کننده آفات و کنترل بیماری ها

● دستورالعمل مصرف:

اختلاط صابون گوگرد دار با سایر سموم توصیه نمی شود.

کود

سولفوکیم ۸۰٪ اس - سی

Sulfokim 80% SC

(کود گوگردی)



● دستورالعمل مصرف:

محصول	محلول پاشی	آبیاری
زراعی، صیفی، گلخانه	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	۴ تا ۵ لیتر در هکتار
باغی	۲ تا ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۵ تا ۷ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

● احتیاطات لازم:

در هنگام مصرف از لباس و دستکش مناسب استفاده شود.



متام سدیم



روغن امولسیون شونده (ولک) کاوش
۸۰٪ مایونز



بهساز



روغن ولک
۹۰٪ امولسیون

سایر محصولات



نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
آکتامیا ۲۴% سوسپانسیون	حشره کش	پسیل پسته، سپردار مرکبات، سفید بالک
اتیون کاوش ۴۷% امولسیون	حشره کش	شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات
استامی پراید ۲۰% پودر حل شونده در آب	حشره کش	پسیل پسته، کرم سیب، مینوز لکه گرد سیب
اسپیروتترامات کاوش ۱۰% سوسپانسیون	حشره کش	پسیل پسته، تریپس پیاز، سپردار قهوه ای مرکبات، سفید بالک گوجه فرنگی، سپردار واوی سیب
ایمیداکلوپراید کاوش ۳۵% سوسپانسیون	حشره کش	پسیل پسته، شته توتون، پروانه مینوز مرکبات، شته های پنبه
ایندوکساکارب کاوش ۱۵% سوسپانسیون	حشره کش	کرم پیله خوار نخود، کرم سیب، کرم قوزه پنبه
بوپروفیزین کاوش ۴۰% سوسپانسیون	حشره کش	سفیدبالک پنبه، بالشتک مرکبات
پرمترین کاوش ۲۵% امولسیون	حشره کش	پرودینای چغندر، مینوز لکه گرد درختان
پروفتوس کاوش ۵۰% امولسیون	حشره کش	کرم قوزه پنبه
پیری پروکسی فن کاوش ۱۰% امولسیون	حشره کش	شپشک قهوه ای مرکبات، عسلک پنبه
تیاترین ۲۵% سوسپانسیون	حشره کش	سفید بالک در خیار، سن سبز پسته
تیاکلوپرید کاوش ۲۴% روغن قابل پخش در آب	حشره کش	پسیل پسته، کرم سیب، سوسک گرده خوار کلزا، سوسک سرشاخه خوار پسته، سن پسته
تیاکلوپرید + دلتامترین کاوش ۲۴% سوسپانسیون	حشره کش	سفید بالک جالیز، کرم غوزه پنبه، تریپس پیاز
دیکلروس کاوش ۵۰% امولسیون	حشره کش	شته، تریپس، عسلک، مگس سفید سبزیها و جالیز
دلتامترین کاوش ۲/۵% امولسیون	حشره کش	پرودینای چغندر، پوره سن گندم، مینوز لکه گرد درختان
دiazinon کاوش ۶۰% امولسیون	حشره کش	کرم خوشه دار انگور
دیمتوات کاوش ۴۰% امولسیون	حشره کش	شته سبز معمولی و شته سمی در غلات، زنجبرک سبز، زنجبرک ناقل کرلی تاپ و شته چغندرقد، شپشک های درختان میوه سردسیری، شته ها، تریپس و حشرات مکنده در سویا، مانند ساقه یونجه
سایپرترین کاوش ۴۰% امولسیون	حشره کش	آفات جونده پنبه، آفات جونده سیب

نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
سایپرمترین ۱۰% EC (حشره کش خانگی)	حشره کش	انواع سوسک، موربانه، سایر حشرات، درون فاضلاب
سایپرمترین ۱۰% سوسپانسیون (حشره کش خانگی)	حشره کش	انواع سوسک، موربانه، سایر حشرات، درون فاضلاب
فن پروپاترین کاوش ۱۰% امولسیون	حشره کش	کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری
فن والریت کاوش ۲۰% امولسیون	حشره کش	پرودینای چغندر قند، مینوز لکه گرد درختان میوه
فنیترتیون کاوش ۵۰% امولسیون	حشره کش	سن ملخ شته های غلات، کرم ساقه خوار برنج، سن ناقل نماتوسپور پسته، سوسک سرشاخه خوار پسته، ملخ بادمجان و یونجه، ملخ آسیایی نیشکر
فوزالون کاوش ۳۵% امولسیون	حشره کش	آفات چغندر قند و سویا، کرم سیب و آلو، پسیل و زنبور و سرخزطومی گلابی و سیب، کرم خوشخ خوارمو، زنجبرک به و مو، پسیل و پروانه چوبخوار پسته، برگخوار آفتابگردان، سرخزطومی یونجه، آفات ذرت، سوسک کلرادو سیب زمینی
فوسکا ۴۰% روغن در آب	حشره کش	سپردار زرد شرقی مرکبات
فیپرونیل کاوش ۵% سوسپانسیون	حشره کش	کرم ساقه خوار برنج، موربانه های خاکزی در نخلستان ها، زنجره انگور
فیپرونیل گرانول ۰/۲% گرانول	حشره کش	کرم ساقه خوار برنج
کاروین ۵۳% سوسپانسیون	حشره کش	کرم قوزه پنبه، تریپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته
کلرپیریفوس کاوش ۴۰/۸ امولسیون	حشره کش	شپشک های مرکبات، سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات، مینوز برگ سویا
کلرپیریفوس گرانول ۵%	حشره کش	کرم های طوقه بر (اگروتیس) در چغندر قند
کیمیا دلتا ۲/۵% سوسپانسیون	حشره کش	سن مادر و پوره سن در گندم
لوفتورون ۵% امولسیون	حشره کش	کرم سیب، پروانه چوبخوار پسته، کرم پيله خوار نخود، کرم غوزه پنبه
	حشره کش	آفات غلات، آفات درختان میوه سردسیری، زنجره میوه خوار و شپشک خرما، مگس چغندر و گیلاس، آفات جالیز، شپشک وشته های مرکبات، پسیل زیتون، آفات یونجه، مله آسیایی نیشکر، شته رز، کاج و چای، آفات غلات و حبوبات انباری
هگزافلومورون کاوش ۱۰% امولسیون	حشره کش	پروانه مینوز مرکبات، پسیل پسته

نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
آزوکسی استروبین + سایپرکونازول کاوش ۲۸% سوسپانسیون	قارچ کش	زنگ زرد گندم
اپوکسی کونازول کاوش ۱۲/۵% سوسپانسیون	قارچ کش	سفیدک سطحی چغندر
ایپرودیون + کاربندازیم کاوش ۵۲/۵% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	خشکیدگی سرشاخه توت، شیت بلایت در برنج، لکه قهوه ای نواری جو
بردو کیمیا ۱۸% سوسپانسیون	قارچ کش	شانکر سیتوسپرای درخت سیب، غربالی درختان میوه، پیچیدگی برگ هلو
پوسکالید + کروگزسیم متیل ۳% سوسپانسیون	قارچ کش	سفیدک پودری شلیل و هلو، سفیدک پودری خیار
پروتیوکونازول + تیوکونازول کاوش ۴۰% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر	قارچ کش	سیاهک پنهان معمولی گندم، سیاهک آشکار، سیاهک آشکار جو
پروپاموکارب هیدروکلراید + فوزتیل آلومینیوم کاوش ۸۴% امولسیون	قارچ کش	بوته میری خیار
پروپیکونازول کاوش ۲۵% امولسیون	قارچ کش	زنگ گندم، شیت بلایت در برنج، فوزاریوم خوشه گندم
پنکونازول کاوش ۲۰% روغن در آب	قارچ کش	سفیدک سطحی انگور
تیوکونازول کاوش ۲۵% روغن در آب	قارچ کش	زنگ زرد گندم
تیوکونازول کاوش ۶% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر	قارچ کش	سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم
تری فلوکسی استروبین + تیوکونازول ۷۵% گرانول پخش شونده در آب	قارچ کش	بلاست برنج، لکه سیاه سیب، سفیدک پودری سیب، سفیدک پودری چغندر، شیت بلایت برنج
تری سیکلازول ۷۵% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	بلاست برنج
تری دمورف کاوش ۷۵% امولسیون	قارچ کش	سفیدک حقیقی چغندر قند، سفیدک حقیقی سبزی و جالیز
تیوفانات متیل ۷۰% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	سیاهک گندم، پوسیدگی سفید ریشه، پوسیدگی ارمیلاریایی ریشه در درختان میوه سردسیری
دیفوروبین ۳۲/۵% سوسپانسیون	قارچ کش	سفیدک پودری خیار
دی متومورف + پیراکلو استروبین کاوش ۱۱/۴% امولسیون	قارچ کش	لکه موجی در گوجه فرنگی
دیفنوکونازول کاوش ۳% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر	قارچ کش	سیاهک پاکوتاه گندم
سایپرکونازول کاوش ۱۰% سوسپانسیون	قارچ کش	زنگ گندم
سایپرکونازول + کاربندازیم ۴۲% سوسپانسیون	قارچ کش	فوزاریوم خوشه گندم، بیماری اسکروتینیایی کلزا

سولفور کاوش ۸۰% سوسپانسیون	قارچ کش	بیماری سفید پودری در انگور
سیازوفامید کاوش ۴۰% سوسپانسیون	قارچ کش	سفیدک کرکی خیار، بادزدگی سیب زمینی
سیموکسائیل + فاموکسادون ۵۲/۵% گرانول پخش شونده در آب	قارچ کش	سفیدک کرکی کدوئیان و پیاز، بادزدگی سیب زمینی
فلوتریافول کاوش ۱۲/۵% سوسپانسیون	قارچ کش	زنگ زرد گندم
فوزتیل آلومینیوم ۸۰% گرانول پخش شونده در آب	قارچ کش	گموز پسته، گموز مرکبات
کاربندازیم ۵۰% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	سیاهک آشکار گندم و جو
کاربوکسین تیرام کاوش ۴۰% مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر	قارچ کش	سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو، پوسیدگی برفی گندم، لکه قهوه ای و پوسیدگی طوقه و ریشه برنج، مرگ گیاهچه پنبه و چغندر، سیاهک پنهان و طویل ذرت خوشه ای
کروزاکسیم متیل ۵۰% گرانول پخش شونده در آب	قارچ کش	سفیدک سطحی و لکه سیاه سیب
کلرالتونیل ۷۵% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	کنترل سفیدک کرکی سیب زمینی، مبارزه با بیماری آلترناریای گوجه فرنگی
کلرالتونیل کاوش ۷۲% سوسپانسیون	قارچ کش	کنترل سفیدک کرکی سیب زمینی، مبارزه با بیماری آلترناریای گوجه فرنگی
کوپراکسی کلراید ۳۵% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	مومیایی پیچیدگی برگ هلو در درختان میوه سردسیری، گموز مرکبات، پوسیدگی گل آذین نخیلات، سفیدک داخلی سبزیجات و جالیز، سفیدک دروغی گوجه
مانکوزب ۸۰% پود قابل تعلیق در آب	قارچ کش	سیاهک پنهان گندم، لکه آجری بادام، کنه نقره ای مرکبات، سفیدک داخلی یونجه، سفیدک دروغی توتون، برق زدگی نخود، زنگ میخک
هگزاکونازول کاوش ۵% سوسپانسیون	قارچ کش	سفیدک سطحی انگور
نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
آبامکتین کاوش ۱/۸% امولسیون	کنه کش	کنه زنگ مرکبات، مینوز سبزی و صیفی
اتوکسازول کاوش ۱۰% سوسپانسیون	کنه کش	کنه قرمز اروپایی سیب
اسپیرودیکلوفن کاوش ۲۴% سوسپانسیون	کنه کش	کنه قرمز اروپایی و کنه تارتین دو نقطه ای سیب، کنه زنگار مرکبات، کنه قرمز مرکبات، پسپیل پسته
بروموپروپیلات کاوش ۲۵% امولسیون	کنه کش	کنه تارنکبوتی چغندر، کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات

بی فنازیت کاوش ۲۴% سوسپانسیون	کنه کش	کنه تارتن دو نقطه ای خیار، توت فرنگی، رز، سیب
پروپارزیت کاوش ۵۷% امولسیون	کنه کش	کنه تار عنکبوتی چغندرقد و پنبه و سویا، کنه قرمز اروپایی درختان میوه، کنه پسته و حبوبات، کنه پاکوتاه چای، کنه دونقطه ای اشجار جنگلی و گیاهان غیر مثمر، کنه دو لکه ای لوبیا، کنه قرمز اروپایی سیب
فنازاکوئین کاوش ۲۰% سوسپانسیون	کنه کش	علیه کنه قرمز اروپایی درختان سیب
کاوامکتین ۱/۸% سوسپانسیون	کنه کش	مینوز سبزی و صیفی، کنه زنگ مرکبات
کلوفنتزین کاوش ۵۰% سوسپانسیون	کنه کش	کنه قرمز اروپایی، درختان میوه سردسیری
هگزی تیاژوکسی کاوش ۱۰% امولسیون	کنه کش	کنه قرمز مرکبات
نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
ای پی تی سی کاوش ۸۲% امولسیون	علف کش	علف های هرز یونجه، شبدر و اسپرس، ذرت
اکسی فلورفن کاوش ۲۴% امولسیون	علف کش	علف های نازک برگ و پهن برگ پیاز
اگزادیازون کاوش ۱۲% امولسیون	علف کش	علف های هرز مزارع برنج
ایوکسینیل کاوش ۲۲/۵% امولسیون	علف کش	علف های نازک برگ و پهن برگ پیاز
بنتازون کاوش ۴۸% مایع قابل حل در آب	علف کش	علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در مزارع برنج، سویا، یونجه و شبدر
بیسپیریپیک سدیم ۴۰% سوسپانسیون	علف کش	جهت کنترل علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها در برنج
پاراکوات کاوش ۲۰% مایع قابل حل در آب	علف کش	مسس یونجه و شبدر و اسپرس، علف های هرز درختان میوه دانه دار و هسته دار و مرکبات، علف های هرز سیب زمینی و نیشکر
تری بنورون متیل ۷۵% پودر قابل انتشار در آب	علف کش	علف های هرز پهن برگ مزارع گندم
تری فلورالین کاوش ۴۸% امولسیون	علف کش	علف های هرز آفتابگردان، علف های هرز پنبه، علف های هرز چغندر، علف های هرز سویا
تو فور دی کاوش ۷۲% مایع قابل حل در آب	علف کش	علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو، علف های هرز پهن برگ مزارع برنج، علف های هرز پهن برگ مزارع ذرت، علف های هرز پهن برگ مزارع نیشکر
تو فور دی + ام سی پی ای کاوش ۶۷/۵% مایع قابل حل در آب	علف کش	علف های هرز پهن برگ مزارع جو، علف های هرز پهن برگ مزارع گندم
تیوبنکارپ کاوش ۵۰% امولسیون	علف کش	علف های هرز مزارع برنج

دیکلوفوپ متیل کاوش ۳۶% امولسیون	علف کش	علف های هرز کشیده برگ مزارع گندم و جو
ستوکسیدیم کاوش ۱۲/۵% امولسیون روغنی	علف کش	علف های هرز کشیده برگ (سوروف در چغندر و پیاز)
سنکو کیمیا ۴۸% سوسپانسیون	علف کش	اغلب پهن برگ ها، تعدادی از کشیده برگ ها در سیب زمینی و سویا
فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت ۲۷/۴% امولسیون	علف کش	علف های هرز پهن برگ چغندر قند
فنوکسپروپ پی اتیل کاوش ۷/۵% روغن در آب	علف کش	علف های هرز کشیده برگ در گندم و جو
کلتودیم ۱۲% امولسیون	علف کش	علف های هرز باریک برگ مزارع چغندر قند، سویا، پیاز
کلودینافوپ پروپارژیل کاوش ۸% امولسیون	علف کش	علف های هرز کشیده برگ یکساله در مزارع گندم (یولاف وحشی، خونی علف چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)
گلایفوس ۴۱% مایع قابل حل در آب	علف کش	جهت کنترل علف های هرز یکساله
گلیفوزیت کاوش ۴۱% مایع قابل حل در آب	علف کش	علف های هرز یکساله و دائمی درختان میوه و نیشکر
لینورون کاوش ۴۵% سوسپانسیون	علف کش	علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ هویج ذرت سیب زمینی، پنبه و سویا نیشکر، مزارع عدس دیم، مزارع نخود دیم
مولینت کاوش ۷۱% امولسیون	علف کش	علف هرز سوروف در برنج
نیکوسولفورون کاوش ۴% سوسپانسیون	علف کش	علف های هرز کشیده برگ مزارع ذرت
وجین ۱۲/۵% سوسپانسیون	علف کش	علف های هرز غالب شالیزار (سوروف، پیروز و جگن ها)
هالوکسی فوپ آرمیتیل کاوش ۱۰/۸% امولسیون	علف کش	علف های باریک برگ پیاز، علف های باریک برگ در چغندر، علف های هرز باریک برگ کلزا
یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل کاوش ۱/۲% روغن قابل پخش در آب	علف کش	برخی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم
یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل + دیفلوفتیکان کاوش ۸/۲۵% روغن قابل پخش در آب	علف کش	برخی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم
نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
بهساز	سایر محصولات	تصحیح PH آب و رساندن آن به محدوده مطلوب برای عملکرد بهتر سموم

نام سم	دسته بندی	موارد ثبت
روغن امولسیون شونده (ولک) کاوش ۸۰% مایونز	سایر محصولات	مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک ها و برخی کنه ها برای همراهی برخی از سموم به عنوان مویان یا Adjuvant
روغن ولک ۹۰% امولسیون	سایر محصولات	مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک ها و برخی کنه ها برای همراهی برخی از سموم به عنوان مویان یا Adjuvant
سولفوکیم ۸۰% سوسپانسیون	سایر محصولات	زراعی، صیفی، گلخانه و باغی
صابون محلول پاشی حاوی گوگرد	سایر محصولات	پسیل پسته
متمام سدیم	سایر محصولات	نماتدهای مولد غده و ریشه سبزی ها و جالیز، سیب زمینی، چغندر قند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته





کاوش کیمیای کرمان
Kavosh Kimia Kerman

کرمان / خیابان امام
نرسیده به میدان قرنی
مجتمع اداری آفتاب / طبقه اول

☎ 034 32260090_91

☎ 0913 440 3414

☎ 034 32227289

☎ 100032260090

✉ info@kavoshkimia.com

🌐 www.kavoshkimia.com